

## EIGNUNG der Qualitäts-Saatmischungen

### einsömrriger, mehrschnittiger Ackerfutterbau

Saattermin: März/April  
 vorwiegende Nutzungseignung: A2 Silage, Heu  
 1.1. Silage, Heu  
 1.2. Frischfutter

### überjähriger, mehrschnittiger Ackerfutterbau

Saattermin: Ende Juli bis  
 Anfang September

vorwiegende Nutzungseignung: A1 Silage, Heu  
 2.1. Silage, Heu  
 2.2. Silage, Heu  
 2.3. Silage  
 2.4. Frischfutter

### zwei- und mehrjähriger Ackerfutterbau

Saattermin: März/April  
 vorwiegende Nutzungseignung: 3.1. Frischfutter, Silage, Heu  
 3.2. Silage, Heu  
 3.3. Frischfutter  
 3.4. Frischfutter, Silage, Heu  
 3.5. Frischfutter  
 3.6. Silage, Heu  
 3.7. Silage, Heu  
 3.8. Silage, Heu  
 3.9. Silage, Frischfutter, Heu  
 3.10. Silage, Frischfutter, Heu

Thüringer Qualitäts-Saatmischungen sind ein Beratungsangebot der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft. Es wird damit das Ziel verfolgt, den Landwirten und Beratern Informationen für den bedarfsgerechten, ausgewogenen Futterbau auf dem Ackerland an die Hand zu geben.

Die Qualitäts-Saatmischungen für den Ackerfutterbau berücksichtigen langjährige praktische Erfahrungen sowie Versuchsergebnisse und entsprechen den Standortbedingungen im Freistaat Thüringen.

## SORTENEMPFEHLUNG

	AG		AG
<b>Deutsches Weidelgras früh</b>		<b>Wiesenlieschgras</b>	
Arvicola (t)	6, 7	Comer	6, 7
Lacerta (t)	7	Lischka	6, 7
Salamandra (t)	6, 7	Licora	6, 7
Lipresso	6, 7	Lirocco	6, 7
<b>Deutsches Weidelgras mittel</b>		<b>Wiesenschwingel</b>	
Alligator (t)	6, 7	Cosmolit	6, 7
Aubisque (t)	6, 7	Cosmonaut	6
Eurostar (t)	6, 7	Liherold	6
Trivos (t)	6, 7	Pradel	6, 7
		Preval	6, 7
<b>Deutsches Weidelgras spät</b>		<b>Knautgras</b>	
Barélan (t)	6, 7	Oberweihst	6, 7
Forza (t)	6, 7	Horizont	6, 7
Twymax (t)	6, 7		
Vesuve (t)	6, 7	<b>Festulolium</b>	
<b>Welsches Weidelgras</b>		Felopa (t)	6, 7
Jeanne (t)	6, 7	Lifema (t)	6, 7
Melquatro (t)	6, 7	Paulita (t)	6, 7
Oryx	7		
Tarandus (t)	6, 7	<b>Glatthafer</b>	
Zarastro	6	Arel 41	6, 7
Zorro (t)	7	Arone	6, 7
<b>Einjähriges Weidelgras</b>		<b>Rotklee</b>	
Aktiv	6, 7	Atlantis (t)	6, 7
Barsutra (t)	6, 7	Tempus (t)	6, 7
Jumper (t)	6, 7	Titus (t)	6, 7
Lemnos (t)	6, 7		
Melworld	6, 7	<b>Luzerne</b>	
Mendoza	6, 7	Fiesta	6, 7
Suxyl	6, 7	Filla	6, 7
		Sanditi	6, 7
<b>Bastardweidelgras</b>		<b>Persischer Klee</b>	
Enduro (t)	6, 7	Felix	6, 7
Ibex (t)	6, 7		
Leonis (t)	6, 7		
Pirol	6, 7		
Rusa (t)	6, 7		

t = tetraploide Sorte


Herausgeber: Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft  
 Naumburger Str. 98, 07743 Jena  
 Abteilung Tierproduktion,  
 Ref. Grünland und Futterbau

Bearbeiter: Dr. Walter Peyker und Harald Hegner  
 Jena, März 2010

Thüringer Landesanstalt  
 für Landwirtschaft



# Thüringer Qualitäts-Saatmischungen für den Ackerfutterbau



## 2010 bis 2011

Thüringer Ministerium  
 für Landwirtschaft, Forsten  
 Umwelt und Naturschutz

FREISTAAT  
 THÜRINGEN



## ANBAUGEBIETE FÜR DEN MEHRSCNITTIGEN ACKERFUTTERBAU IN THÜRINGEN

Anbaugelände für den mehrschnittigen Ackerfutterbau in Thüringen	<b>6</b>	<b>7</b>
Bezeichnung	<b>sommertrockene Lagen</b>	<b>günstige Übergangslagen</b>
Beschreibung	< 350 m über NN < 600 mm Jahresniederschlag > 8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft	350 - 600 m über NN 600 - 800 mm Jahresniederschlag 6 - 8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft

## THÜRINGER QUALITÄTS-SAATMISCHUNGEN FÜR DEN ACKERFUTTERBAU

### Einsömmeriger und überjähriger Ackerfutterbau

Art	Saatmenge (kg/ha)							
	einsömmerig			überjährig				
	A2	1.1.	1.2.	A1	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.
<b>Empfohlen für Anbaugelände</b>	6, 7	6, 7	7	6, 7	6, 7	6, 7	7	7
Einjähriges Weidelgras	15	40	5					
Welsches Weidelgras	diploid tetraploid		5	27 13	30	40	20	6
Persischer Klee			10					
Rotklee							8	12
<b>Mischung</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>18</b>

### Zwei- und mehrjähriger Ackerfutterbau

Art	Saatmenge (kg/ha)									
	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3.10.
<b>Empfohlen für Anbaugelände</b>	7	7	7	7	6	6	6	6	6, 7	6, 7
Bastardweidelgras / Festulolium		16	20							
Deutsches Weidelgras		4		4						
Wiesenschwingel	9			10			6	6	5	8
Wiesenschneggras	3			3				2	2	4
Knautgras					2	4				
Glatthafer						3	2			2
Rotklee	13	8	8	11					6	5
Luzerne					18	13	12	10	7	6
<b>Mischung</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>25</b>

### Reinsaat

<b>Empfohlen für Anbaugelände</b>	6	7
Reinsaat (12 kg/ha)	Luzerne	Rotklee

Mischungen mit der Bezeichnung „A“ werden in den Bundesländern Thüringen, Sachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz empfohlen. Die Mischungen 1.2 (QA 4), 3.1 (QA 5), 3.4 (QA 6), 3.6 (QA 7), 3.9 (QA 8) und 3.10 (QA 10) werden in Thüringen und Sachsen empfohlen. Die Empfehlung der anderen Mischungen gilt nur für Thüringen.