

## SORTENEMPFEHLUNG

### Die Sorten werden empfohlen von:

- Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft
- Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum - Eifel - Rheinland-Pfalz
- Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
- Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
- Landwirtschaftskammer für das Saarland

Die für die einzelnen Arten empfohlenen Sorten sind das Ergebnis der Sortenversuche aus oben genannten Ländern. Zusätzlich werden Winterhärte, Krankheitsresistenz und Narbendichte aus der „Beschreibenden Sortenliste Futtergräser, Esparsette, Klee, Luzerne 2009“ berücksichtigt.

Firmen, die THÜRINGER QUALITÄTS-SAATMISCHUNGEN herstellen und vertreiben müssen die Rezepturen einhalten und ausschließlich die fett gekennzeichneten empfohlenen Sorten einsetzen.

Sorte	AG	Sorte	AG
<i>Deutsches Weidelgras früh</i>		<i>Deutsches Weidelgras mittel</i>	
Artesia (t)	7	<b>Aubisque (t)</b>	6, 7, 10
Arvella	6, 7	<b>Barnauta (t)</b>	6, 7, 10
<b>Arvicola (t)</b>	6, 7, 10	<b>Clermont (t)</b>	7, 10
Ikaros	6, 7	<b>Eurostar (t)</b>	6, 7, 10
<b>Lacerta (t)</b>	6, 7, 10	Fennema	7, 10
<b>Lipresso</b>	7, 10	<b>Option</b>	7, 10
<b>Picaro</b>	7, 10	<b>Premium</b>	7, 10
Salamandra (t)	7	<b>Respect</b>	7, 10
<i>Deutsches Weidelgras spät</i>		Rodrigo	7
<b>Akurat (t)</b>	6, 7, 10	Toronto	7
Arusi (t)	6, 7	<b>Twins (t)</b>	7, 10
Barelan (t)	7, 10	Weigra	7
<b>Barmaxima (t)</b>	6, 7, 10	<i>Wiesenschwingel</i>	
<b>Elgon (t)</b>	7, 10	<b>Barvital</b>	6, 7
<b>Kentaur (t)</b>	6, 7, 10	<b>Cosmolit</b>	6, 7, 10
Montando (t)	7, 10	<b>Lifara</b>	6, 7
<b>Navarra (t)</b>	6, 7, 10	<b>Pardus</b>	7
Sirius (t)	7, 10	<b>Pradel</b>	6, 7, 10
<b>Turandot (t)</b>	6, 7, 10	<b>Preval</b>	6, 7, 10
<b>Vesuve (t)</b>	6, 7, 10		

Sorte	AG	Sorte	AG
<i>Wiesenlieschgras</i>		<i>Knautgras</i>	
<b>Classic (m)</b>	6, 7, 10	<b>Baraula (s)</b>	6, 7, 10
<b>Comer (m)</b>	7, 10	<b>Lidacta (m)</b>	6, 7, 10
<b>Rasant (f)</b>	6, 10	<b>Lupre (s)</b>	6, 7
<b>Phlewiola (f)</b>	7, 10	<b>Oberweihst (m)</b>	6, 7
Crescendo (m)	6, 7	<b>Treposno (m)</b>	6, 7
<i>Wiesennispe</i>		<i>Rotschwingel</i>	
<b>Lato</b>	6, 7, 10	<b>Condor</b>	7
<b>Liblue</b>	6, 7, 10	<b>Gondolin</b>	6, 7, 10
<b>Likollo</b>	6, 7, 10	<b>Roland 21</b>	7, 10
Nixe		<b>Tagera</b>	6, 7
<i>Wiesenschweidel</i>		<i>Wiesenfuchsschwanz</i>	
<b>Lifema (t)</b>	6, 7, 10	<b>Alko</b>	6, 7, 10
<b>Paulita (t)</b>	6, 7, 10	<b>Alopex</b>	6, 7, 10
<i>Glatthafer</i>		<b>Alpha</b>	6, 7, 10
<b>Arone</b>	6, 7, 10	<b>Talope</b>	6, 7, 10
<i>Weißklee</i>		<b>Vulpera</b>	6, 7, 10
<b>Alice</b>	6, 7, 10	<i>Rotklee</i>	
<b>Jura</b>	6, 7, 10	<b>Merula</b>	6, 7, 10
<b>Klondike</b>	6, 7, 10	<b>Milvus</b>	6, 7, 10
Rabbani	6, 7, 10		
<b>Riesling</b>	6, 7, 10		
Vysocan	6, 7, 10		

*Goldhafer Schwedenklee, Luzerne, Hornklee*  
 Alle in der „Beschreibenden Sortenliste Futtergräser, Esparsette, Klee, Luzerne 2009“ aufgeführten Sorten

*Weißes Straußgras und Gelbklee*  
 Handelssaatgut

AG = Anbaugebiet  
 t = tetraploide Sorte    f = früh    m = mittel    s = spät

Herausgeber: Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft  
 Naumburger Str. 98, 07743 Jena  
 Abteilung Tierproduktion,  
 Ref. Grünland und Futterbau

Bearbeiter: Dr. Hans Hochberg und Harald Hegner

Jena, März 2010


Besuchen Sie uns auch im Internet: [www.tll.de/ainfo](http://www.tll.de/ainfo)



Thüringer Landesanstalt  
für Landwirtschaft



# Grünland-Mischungen für Thüringen 2010/2011



## THÜRINGER ANBAUGEBIETE GRÜNLAND

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
6	sommertrockene Lagen	< 350 m über NN < 600 mm Jahresniederschlag > 8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft
7	günstige Übergangslagen	350 - 600 m über NN 600 - 800 mm Jahresniederschlag 6 - 8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft
10	Mittelgebirgslagen Ost	> 600 m über NN > 800 mm Jahresniederschlag < 6 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft

Die Grünlandmischungen entsprechen den Standortbedingungen in Thüringen. Sie basieren auf langjährigen Erfahrungen sowie Ergebnissen und sind in ihrer Zusammensetzung auf die Nutzungsformen des Wirtschaftsgrünlandes abgestimmt.

**QUALITÄTS-STANDARD-MISCHUNGEN (G)** sind auf **hohe Produktivität** und **THÜRINGER QUALITÄTS-SAATMISCHUNGEN (QG)** auf **hohe Leistungsdauer** ausgerichtet. Letztere sind identisch mit denen im Freistaat Sachsen.

Alle Mischungen sind auch geeignet für den Ökolandbau.

Der Landwirt hat Anspruch auf den Nachweis der Zusammensetzung der Mischung. Die Teilsaatmengen sind in kg/ha bzw. % der Saatmenge anzugeben. Letzteres hat keinen direkten Bezug zum späteren Anteil im Bestand, da in der Saatmischungsmenge die unterschiedlichen Tausendkorngewichte (TKG) der Sorten unbeachtet bleiben müssen.

## GRÜNLANDMISCHUNGEN FÜR THÜRINGEN

Bezeichnung	Qualitäts-Standard-Mischungen für Dauer- und Mähweiden, Wiesen					Thüringer Qualitäts-Saatmischungen für Wiesen, Weiden und Mähweiden								
	Dauer- und Mähweiden			Wiesen		Wiesen			Weiden und Mähweiden				Nachsaat	
	G II	G V	G V K	G VII	G X	QG 1	QG 2	QG 3	QG 4	QG 5	QG 6	QG 7	N 1	N 2
<b>Empfohlen für Thüringer Anbau-gebiet</b>	6 7 10	7 10	7 10	7	6	6	7	7 10	6 7	7 10	7	6 7 10	6 7 10	7 10
	Teilsaatmenge (kg/ha)													
Dt. Weidelgras														
früh	4	5	4						1	1	3			
mittel	5	5	4				1		1	1	5	1	5	1
spät	5	10	10				2		1	1	7	2	5	3
Wiesenschwingel	6			13	5	13	15	10		14		8		10
Wiesenlieschgras	5			5	1	3	5	3	3	4	3	4		1
Wiesenrispe	3			5	5	2	2	2	3	4	4	4		
Rotschwingel					6	4		4	2	3		7		
Knautgras					4	2 <sup>3)</sup>		1 <sup>4)</sup>	6 <sup>3)</sup>			1 <sup>4)</sup>		
Glatthafer						3		1						
W.Fuchsschwanz				2			2							
W.Straußgras				1										
Goldhafer								1						
Wiesenschweidel									5					
Weißklee	2		2	2		1	1	1	2	2	2	2	2 <sup>2)</sup>	2 <sup>2)</sup>
Rotklee						2	2	2	1		1	1		
Schwedenklee				2										
Luzerne					1									
Hornklee					2	2 <sup>1)</sup>								
Gelbklee					1									
<b>Gesamt (kg/ha)</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>17</b>

1) auf Muschelkalkstandorten zusätzlich beimischen  
3) 50 % späte Sorten verwenden

2) Beimischung nur auf Wunsch des Landwirtes  
4) nur späte Sorten verwenden