

Thüringer Qualitäts- Saatmischungen für den Ackerfutterbau (Eignung für KULAP bzw. ÖVF)

2018/19

EIGNUNG der Qualitäts-Saatmischungen

einsömrriger, mehrschnittiger Ackerfutterbau

Saattermin:	März/April	
vorwiegende	A2	Silage, Heu
Nutzungs- eignung:	1.1.	Silage, Heu
	1.2.	Frischfutter

überjähriger, mehrschnittiger Ackerfutterbau

Saattermin:	Ende Juli bis Anfang September	
vorwiegende	A1	Silage, Heu
Nutzungs- eignung:	2.1.	Silage, Heu
	2.2.	Silage, Heu
	2.3.	Silage
	2.4.	Frischfutter

zwei- und mehrjähriger Ackerfutterbau

Saattermin:	März/April	
vorwiegende	3.1.	Frischfutter, Silage, Heu
Nutzungs- eignung:	3.2.	Silage, Heu
	3.3.	Frischfutter
	3.4.	Frischfutter, Silage, Heu
	3.5.	Frischfutter
	3.6.	Silage, Heu
	3.7.	Silage, Heu
	3.8.	Silage, Heu
	3.9.	Silage, Frischfutter, Heu
	3.10.	Silage, Frischfutter, Heu

Die Qualitäts-Saatmischungen für den Ackerfutterbau berücksichtigen langjährige praktische Erfahrungen sowie Versuchsergebnisse und entsprechen den Standortbedingungen im Freistaat Thüringen.

ANBAUGEBIETE FÜR DEN MEHRSCHNITTIGEN ACKERFUTTERBAU IN THÜRINGEN

6 sommertrockene Lagen

- < 350 m über NN
- < 600 mm Jahresniederschlag
- > 8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft


7 günstige Übergangslagen

- 350 - 600 m über NN
- 600 - 800 mm Jahresniederschlag
- 6 - 8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft

SORTENEMPFEHLUNG

Dt. Weidelgras früh	AG	Bastardweidelgras	AG
Artesia (t)	6, 7	Acrobat (t)	6, 7
Arvicola (t)	6, 7	Astoncrusader (t)	6, 7
Genesis	6, 7	Ibex (t)	6, 7
Giant (t)	6, 7	Leonis (t)	6, 7
Karatos (t)	6, 7	Rusa (t)	6, 7
Mirtello (t)	6, 7	Wiesenschwingel	
Dt. Weidelgras mittel		Cosmolit	6, 7
Alligator (t)	6, 7	Cosmonaut	6, 7
Barcampo (t)	6, 7	Cosmopolitan	6, 7
Diwan (t)	6, 7	Liherold	6, 7
Garbor (t)	6, 7	Pardus	6, 7
Kufuga (t)	6, 7	Pradel	6, 7
Ozia (t)	6, 7	Praxilla	6, 7
Trend (t)	6, 7	Preval	6, 7
Tribal (t)	6, 7	Wiesentlieschgras	
Trintella (t)	6, 7	Aturo	6, 7
Dt. Weidelgras spät		Comer	6, 7
Albion (t)	6, 7	Licora	6, 7
Forza (t)	6, 7	Lischka	6, 7
Irondal (t)	6, 7	Phlewiola	6, 7
Kentaur (t)	6, 7	Rubato	6, 7
Merkem (t)	6, 7	Summergraze	6, 7
Montova (t)	6, 7	Knautgras	
Novello (t)	6, 7	Barlegro	6, 7
Polim (t)	6, 7	Diceros	6, 7
Thalassa (t)	6, 7	Dragoner	6, 7
Twymax (t)	6, 7	Revolin	6, 7
Valerio (t)	6, 7	Treposno	6, 7
Welsches Weidelgras		Rotklee	
Barherta	6, 7	Blizard (t)	6, 7
Barmultra II (t)	6, 7	Elanus (t)	6, 7
Dolomit (t)	6, 7	Fregata (t)	6, 7
Dorike (t)	6, 7	Larus (t)	6, 7
Fabio (t)	6, 7	Magellan (t) ¹⁾	6, 7
Gemini (t)	6, 7	Monsun (t)	6, 7
Lipos (t)	6, 7	Taifun (t) ¹⁾	6, 7
Lyrik (t)	6, 7	Tempus (t)	6, 7
Melquatro (t)	6, 7	Titus (t) ¹⁾	6, 7
Mervana (t)	6, 7	Tornado (t)	6, 7
Oryx	6, 7	Luzerne	
Tarandus (t)	6, 7	Alpha	6, 7
Taurus (t)	6, 7	Catera	6, 7
Einjähriges Weidelgras		Daphne	6, 7
Aktiv	6, 7	Filla	6, 7
Bendix (t)	6, 7	Fleetwood	6, 7
Jumper (t)	6, 7	Fraver	6, 7
Melworld	6, 7	Fusion	6, 7
Mendoza	6, 7	Planet	6, 7
Festulolium		Plato	6, 7
Achilles (t)	6, 7	Sanditi	6, 7
Fedoro (t)	6, 7	Verko	6, 7
Mahulena (h)	6, 7	(t) = tetraploide / (h) = haploide Sorte	
Paulita (t)	6, 7	¹⁾ nicht für Stängelbrennerbefallslagen	
Glatthafer, Persischer Klee			

Alle in der aktuellen „Beschreibenden Sortenliste Futtergräser, Esparssette, Klee, Luzerne“ aufgeführten Sorten



THÜRINGER QUALITÄTS-SAATMISCHUNGEN FÜR DEN ACKERFUTTERBAU

Einsömmriger und überjähriger Ackerfutterbau

Art	Saatmenge (kg/ha)					
	Einsömmrig			Überjährig		
	A2	1.1.	1.2. K	A1*	2.1.	2.2 K
Empfohlen für Anbauggebiet	6, 7	6, 7	7	6, 7	7	7
Einjähriges Weidelgras	15	40	5			
Welsches Weidelgras	30		5	30-40	20	6
Persischer Klee			10			
Rotklee					8	12
Mischung	45	40	20	30-40	28	18

* Aussaatstärke 30 kg/ha bei diploiden Sorten, bei tetraploiden je nach Anteil bis 40 kg/ha

Zwei- und mehrjähriger Ackerfutterbau

Art	Saatmenge (kg/ha)									
	3.1. K	3.2.	3.3.	3.4. K.	3.5. K	3.6. K	3.7. K	3.8. K	3.9. K	3.10. K
Empfohlen für Anbauggebiet	7	7	7	7	6	6	6	6	6, 7	6, 7
Bastardweidelgras/Festulolium		16	20							
Deutsches Weidelgras		4		3						
Wiesenschwingel	9			10			6	6	5	6
Wiesenlieschgras	3			2				2	2	2
Knautgras					2	4				
Glatthafer						3	2			2
Rotklee	13	8	8	13					6	7
Luzerne					18	13	12	10	7	8
Mischung	25	28	28	28	20	20	20	18	20	25

Reinsaat

Empfohlen für Anbauggebiet	6	7
Reinsaat (12 kg/ha)	Luzerne	Rotklee

Gemenge mit Körnerleguminosen [empfohlen für KULAP, ökologische Vorrangflächen (ÖVF) und alle Anbaugebiete]

Art	Saatmenge (kg/ha)	Art	Saatmenge (kg/ha)	Art	Saatmenge (kg/ha)	Art	Saatmenge (kg/ha)
Ackerbohne	mind.150	Wintererbse	mind. 40	Sommererbsen	mind. 80	Blaue Lupine	min. 80
Getreide (auch mehrere) Wintertriticale, Winterweizen bzw. Hafer, Triticale	max. 100	Wintergetreide (auch mehrere) Winterweizen, Wintertriticale, Winterroggen	max. 100	Sommergetreide (auch mehrere) Hafer, Sommergerste	max. 80	Getreide (auch mehrere) Sommergerste, Hafer	max. 80

Mischungen mit der Bezeichnung „A“ werden in den Bundesländern Thüringen, Sachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz empfohlen. Die Mischungen 1.2 (QA 4), 3.1 (QA 5), 3.4 (QA 6), 3.6 (QA 7), 3.9 (QA 8) und 3.10 (QA 10) werden in Thüringen und Sachsen empfohlen. Die Empfehlung der anderen Mischungen gilt nur für Thüringen.

K = für KULAP bzw. ÖVF geeignet (empfohlen)